

## Viertes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Opiz, Altstadt, Mittergasse No. 559 zum Tausch oder Kauf\*) unter den im Kratos — und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingungen vorrätzig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Beforgung der Gegenseudungen verhältnißmäßige Geldvorschuße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 fr. C. M.

*Mentha ballotaefolia.* Opiz. (Weihe.) <sup>8)</sup> — *coerulea.* Weihe. (Weihe.) <sup>9)</sup> — *ocymiodora.* Opiz. (Weihe.) <sup>10)</sup>

---

\*1) Die Centurie à 4 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten.

8) *Mentha floribus verticillatis, verticillis pedunculatis, caule piloso, pilis deflexis; foliis pilosiusculis, lateovatis, longe petiolatis, grosse et obtuse serratis, obtusiusculis; petiolis dilatatis, ciliatis; foliis floralibus subsessilibus, subcordatis, pedunculis villosis; bracteis lanceolato-subulatis, ciliatis; calicibus cylindraceis, 10. angulatis, hirsutis, coloratis, corollis barbatis, staminibus corolla brevioribus.* Opiz. In Principatu Minden. Weihe.

9) *Mentha floribus verticillatis, verticillis subpedunculatis, caule erecto piloso, ad geniculos barbato, pilis deflexis, foliis basi fere ad medium integerrimis, pilosis, ovatis, petiolatis, serratis, obtusis, subtus resinospunctatis, inferioribus in petiolum decurrentibus, superioribus basi flatoribus, — floralibus subsessilibus, tortuosis, subintegerrimis, petiolis villosis, dilatatis, pedunculis retrorsum pilosis, bracteis lanceolato-setaceis, ciliatis, longitudine calicibus, calicibus resinospunctatis, hirsutis, subcylindricis, striatis, corollis elongatis, hirsutis, staminibus corolla brevioribus.* Opiz. Hat fast blaue Blumen und wächst zu Menighüffen am Fluße die Bäche, besonders häufig am Schlosse Ulenburg an der Mühle. Weihe. <sup>22</sup> 23. differt a *M. galeopsisfolia.* Opiz. foliis fere ad medium integerrimis, ob-

*Melitis melissophyllum*. L. (Hentschel.) — *Mentha austriaca*. Jacq. (Prochaska.) — *gentilis*. L. (Weihe.) — *sylvestris*. L. (Prochaska.) — *aquatica*. L. (Kostelecky.) — *Mercurialis ambigua*. L. (Günther.) — *annua*. L. (Benesch.) — *perennis*. L. (Eisenstein.) — *ovata*. Hoppe et Sternb. (Fürrrohr.) — *Mesembryanthemum hirtellum*. Haw. (Adamowsky.) — *rubricaulis*. Willd. (Adamowsky.) — *cordifolium*. L. (Masner.) — *glomeratum*. L. (Adamowsky.) — *Mespilus punctata*. (Walter.) — *Cotoneaster*. L. (Opiz.) — *germanica*. L. (Kostelecky.) — *Meum Foeniculum*. Sprengl. (Kostelecky.) — *heterophyllum*. Mönch. (Weihe.) — *sibiricum*. Sgl. (Grabowsky.) — *inundatum*. Sprengl. (Ziz.) — *Micropus supinus*. L. (Reichenbach.) — *Milium paradoxum*. Scopol. (Weihe.) — *vernale*. M. Bieberst. (Kostelecky.) — *Mirabilis Jalappa*. L. (Hentschel.) — *Mitella diphylla*. L. (Walter.) — *Möhringia muscosa*. L. (Braun.) — *Monarda mollis*. Willd. (Günther.) — *clinopodia*. L. (Kostelecky.) — *didyma*. L. (Hentschel.) — *rugosa*. Ait. (Günther.) — *media*. W. (Günther.) — *Monilia picea*. Funk. (Gerhard.) — *Montia minor*. Gmel. (Weihe.) — *Morchella costata*. Pers. (Gerhard.) — *Morus alba*. L. (Mann.) — *Myagrum austriacum*. Jacq. (Benesch.) — *sativum*. L.

tusis, petiolis villosis, foliis floralibus tortuosis, subintegerrimis, corollis elongatis, hirsutis. Opiz.

- 10) *Mentha spicis* cylindraceis, interruptis, caule subcolorato, glabro, basi pubescente, foliis lanceolatis, basi cuneatis, subpetiolatis, inaequaliter argute serratis, glaberrimis, apice acutis, integerrimis, subtus sesinoso-punctatis, ramis petiolatis, usque ad medium integerrimis, summis cuspidatis, subsessilibus et cuspidato-serratis, bracteis setaceis, calicibus brevissimis, pedunculisque glabris, resinosis, dentibus calicinis longissimis bracteisque hirsutis, staminibus corolla brevioribus. Opiz. Coluit Weihe. Differt a *M. Schlmeyeri*. Opiz. cui proxima, foliis acutioribus, apice integerrimis, glaberrimis, ramis usque ad medium integerrimis, staminibus corollo brevioribus, et odore Ocymi, a *M. laevigata* W. foliis lanceolatis, glaberrimis, apice acutis. Est quasi intermedia inter *M. laevigata* W. et *Schlmeyeri*. O.

(Walter.) — saxatile. L. (Sommerauer.) — perfoliatum. L. (Kosteletzky.) — *Myosotis sylvatica*. Ehrh. (Moschner.) — arvensis. L. (Eisenstein.) — Lappula. L. (Mann.) — palustris. With. (Chotek.) — sparsiflora. Mickan. (Opiz.) — intermedia. Link. (Weihe.) — hispida. Schlechtendahl. (Weihe.) — verna. Opiz. (Opiz.) — stricta. Link. (Weihe.) — *Myosurus minimus*. L. (Winkler.) — *Myriophyllum spicatum*. L. (Kosteletzky.) — *Myrrhis hirsuta*. (Eisenstein.) — *Narcissus Pseudo-narcissus*. L. (Hentschel.) — *Nardus stricta*. L. (Uechtriz.) — *Neckera splachnoides*. (Sehlmeyer.) — crispa. (Bauer.) — curtipendula. (Sykora.) — pennata. (Fürrrohr.) — ulophylla. (Sehlmeyer.) — viticulosa. (Opiz.) — *Nepeta multibracteata* Desf. (Braun.) — graveolens. Villars. (Braun.) — latifolia. Dec. (Braun.) — violacea. Linn. (Walter.) — Cataria. L. (Prag. Kosteletzky.) — Mussini. Sprengl. (Maly. Mann.) — *Nephrodium polymorphum*. Opiz. (Bischofberg. Austerlitz.) — *Nephroma resupinata*. (Wolfsberg bei Gainsbach. Opiz.) — *Nicotiana undulata*. Vent. (Kosteletzky.) — rustica. Linn. (Kosteletzky.) — paniculata. L. (Kosteletzky.) — Tabacum. L. (Mann.) — *Nigella arvensis*. L. (Prag. Kosteletzky.) — damascena. L. (Kosteletzky.) — sativa. L. (Hornung.) — *Nolana prostrata*. L. (Hentschel.) — *Ochrus pallida*. Persoon. (Moschner.) — *Ocimum Basilicum*. L. (Moschner.) — *Oenanthe Phelleandrium*. Lam. (Weistrus. Chotek.) — *Oenothera Romanzowiana*. Ledebour. (Reichenbach. Walter.) — rosea. Aiton. (Kosteletzky.) — purpurea. Curtis. (Kosteletzky.) — tetraptera. L. (Kosteletzky.) — biennis. L. (Weistrus. Chotek.) — *Omphalodes linifolia*. (Nenning.) — scorpioides. (Baumgarten. Opiz. Branowic pilsn. Kr. Neumann.) — verna. Mönch. (Mann.) — *Ononis hircina mitis*. Gmel. Fl. bad. (Prag. Kosteletzky.) — viscosa. L. (Hentschel.) — spinosa. L. (Prag. Kosteletzky.) — *Ophioglossum vulgatum*. L. (Woleschna. Mörkenstein.) — *Ophrys monorchis*. L. (Herniemder Wiesen. Carl. Döbzig. Gerhard.) — alpina. L. (Gräß. Speckmoser.) — myodes. Jacquin. (Eisenach. Thon.) — *Orchis militaris*. L. (Mariageß. Hölzel.) — ustulata. L. (Bürglitz. Sykora.) — bifolia. L. (Stern. Eisenstein. Prag. Mann.) — conopsea. L. (Woleschna. Mörkenstein.) — coriophora. L. (Bürglitz. Sykora.) — latifolia L. (Eulc. Moschner. Glawc.

tin. Eisenstein.) — *maculata*. L. (Sudeten. Eisenstein.) — *morio*. L. (Prag. Mann.) — *odoratissima*. L. (Dölzig. Gerhard.) — *Origanum majorana*. L. (Kosteletzky.) — *majoranoides*. Willd. (Mann. Masner.) — *vulgare*. L. (Želivec. Moschner.) — *Ornithogalum villosum*. M. Biebst. (Pirna. Bauer.) — *Ornithopus compressus*. L. (Kosteletzky.) — *perpusillus*. L. (Abtinaundorf. Gerhard.) — *scorpioides*. L. (Maly.) — *Ornithogalum luteum*. L. (Prag. Moschner.) — *nutans*. L. (Kaisergarten. Moschner.) — *pyrenaicum*. Huds. (Boritzer Felder. Carl.) — *umbellatum*. L. (Kaiserwiese Mann.) — *Personii*. Hoppe. (Minden. Weihe.) — *Orobanche caryophyllacea*. L. (Eöln. Sehlmeier.) — *ramosa*. L. (Böhmisch brod. Opiz.) — *Orob. tuberosus*. L. (Prag. (Kosteletzky.) — *Orthotrichum Sturmii*. Hoppe et Horns. (Heiligenblut. Bartenstein.) — *diaphanum*. (Prag. Kosteletzky. Opiz.) — *affine*. (Pfaffendorf. Gerhard.) — *annomalum*. (Scharfa. Opiz.) — *Ludwigii*. (Pirna. Bauer.) — *pumilum*. (Eöln. Sehlmeier.) — *crispum*. (Pirna. Bauer.) — *Osmunda Lunaria*. L. (Böhmischaidcha. Prochaska. — *Oxalis corniculata*. L. (Salzburg. Hinterhuber.) — *stricta*. L. (Gausitz. Burekhard.) — *Acetosella*. L. (Stern. Eisenstein) — *Panicum germanicum purpurascens*. (Weihe.) — *plicatum*. Lamark. (Adamowsky.) — *purpurascens*. Opiz. (Michele. Förmánek.) — *scaberrimum*. Lagasc. (Kosteletzky.) — *viride major*. (Weihe.) — *attenuatum*. Mönch. (Weihe.) — *Papaver argemone*. L. (Leipzig. Gerhard.) — *dubium*. L. (Prag. Mann.) — *somniferum*. L. (Moschner.) — *nudicaule*. L. (Günther.) — *Parietaria officinalis*. L. (Kosteletzky.) — *Paris quadrifolia*. L. (Slawětín. Eisenstein) — *quadrifolia quinquefolia*. (Regensburg. Förrrohr.) — *Parmelia conspersa*. Achar. (Prag. Mann.) — *parietina*. Ach. (Prag. Kosteletzky.) — *tiliacea*. Ach. (Prag. Mann.) — *olivacea*. Ach. (Prag. Mann.) — *Parnassia palustris*. L. (Řepčic. Moschner. Ziffa. Kosteletzky.) — *Parthenium luteum*. Sprengl. (Maly.) — *integrifolium*. L. (Sehlmeier.) — *Paspalum stoloniferum*. (Maly.) — *Pastinaca sativa*. L. (Prag. Mann.) — *Pedicularis rostrata*. L. (Kalbling. Sommerauer.) — *verticillata*. L. (Salzburg. Hinterhuber.) — *Pelargonium amplissimum*. Willd. (Walter.) — *anemonefolium*, vom Hrn. Nennig ist *Geranium macrohizum*. L. Mann.

— humifusum. Willd. (Kosteletzky.) — inodorum. Willd. (Kosteletzky.) — nothum. Willd. (Walter.) — penicellatum. Willd. (Walter.) — pulchellum. Willd. (Walter.) — Radula roseum. Willd. (Kosteletzky. Walter. Masner.) — Zonale foliis albo-marginatis. (Adamowsky.) — betulinum. Willd. (Walter.) — quercifolium. Willd. (Adamowsky.) — tomentosum. Willd. (Masner.) — tricolor. Curt. (Adamowsky.) — vitifolium. Willd. (Masner. Walter.) — adoratissimum. Willd. (Masner.) — Zonale. Willd. (Chotek. Masner. Adamowsky.) — *Peltidea venosa*. Achar. (Stern. Ramisch.) — canina. Ach. (Prag. Kosteletzky.) — horizontalis. Achar. (Böheim. Mann. Erzgebirg. Huzelmann.) — *Penisetum cenchroides*. Reich. (Weihe.) — setosum. Rich. (Maly.) — *Peplis Portula*. L. (Seßinsel. Opiz.) — *Pedicularis palustris*. L. (Bischfowic. Palliardi. Hirschberg. Praesens.) — recutita. L. (Kalbling. Sommerauer.) — *Sceptrum carolinum*. (Salzburg. Hinterhuber.) — sudetica. Haenke. (Sudeten. Huzelmann.) — *Peridermium columnare*. Link. (Gerhard.) — *Peziza epidermidis*. Opiz.<sup>21)</sup> (Opiz.) — nidulus. Kunze. (Gerhard.) — *Phalangium Liliago*. (Prag. Moschner.) — ramosum. (Prag. Mann.) — *Phalaris ciliata*. Lagasc. (Braun.) — arundinacea. L. (Prag. Kosteletzky.) — arundinacea picta. (Maly.) — aquatica. L. (Maly.) — minor. Rez. (Walter.) — *Phascom axillare*. (Eöln. Sehlmeier.) — patens. (Leipzig. Gerhard. Eöln. Sehlmeier.) — subulatum. (Prag. Kosteletzky. Břewňow. Opiz.) — *Phaseolus coccineus*. Lam. (Mann.) — nanus. L. (Mann.) — *Philadelphus coronarius*. L. (Břewňow. Kosteletzky.) — *Phleum alpinum*. L. (Schneefoppe. Bracht. Untersberg. Hinterhuber.) — annuum. Bstn. (Kosteletzky.) — arenarium. L. (Mainz. Ziz.) — Böhmeri. Wiebel. (Prag. Mann.) Keßthely. Wierzbicki.) — pratense nodosum. Linn. (Leipzig. Gerhard.) — pratense. L. (Prag. Kosteletzky.) — cuspidatum. Willd. (Maly.) — fellinum. Sibth. et Sm. (Kosteletzky.) — *Phlomis fruticosa*. L. (Hentschel.) — tuberosa. L. (Günther.) — *Phlox paniculata*. L. (Maly. Wawak.) — subulata. L.

<sup>21)</sup> *Peziza sessilis*, subgregaria, atra, glabra, margine convexa. Opiz. Unter der Oberhaut dürerer Weidenäste auf der Seßinsel nächst Prag. Opiz.

(Schlmeyer.) — setacea. L. (Burkhard.) — suaveolens. Aiton. (Kostelecky.) — carolina. L. vom Herrn Grafen von Chotek ist *P. paniculata*. Aiton. Benesch. — *Phragmidium obtusum*. (Leipzig. Reichenbach.) — *Phylla ericoides*. L. (Petters. Maly.) — *Phyllanthus speciosa*. Jacq. (Günther.) — *Epiphyllanthus*. L. (Walter.) — *Phyllireum Sorbeum*. Fries. (Gerhard.) — *Physalis dubia*. Gmel. (Kostelecky.) — *Alkekengi*. L. (Wissehrad. Benesch.) — *barbadensis*. Jacq. (Kostelecky.) — *peruviana*. L. (Kostelecky.) — *Phyteuma orbiculare*. L. (Boleschna. Mörkenstein. Baden. Erxleben.) — *pauciflorum*. L. (Kottemannner Tauern. Sommerauer.) — *haemisphaericum*. L. (Panaegrossus. Steudel.) — *spicatum*. L. (Prag. Kostelecky.) — *virgatum*. Willd. (Günther.) — *Picridium vulgare*. Desf. (Kostelecky.) — *tingitanum*. Desf. (Mann.) — *Picris hieracioides*. L. (Grätz. Speckmoser.) — *Pillularia globulifera*. (Minden. Weihe. Nießy. Burkhard.) — *Pimpinella Saxifraga*. L. (Prag. Kostelecky.) — *Pinguicula alpina bimaculata*. R. et S. (Rapunzerberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — *Pinus microcarpa*. Lamb. (Walter.) — *sylvestris*. L. (Prag. Moschner.) — *strobilus*. L. (Maly.) — *Piper Blandum*. L. (Adamowsky.) — *verticillatum*. L. (Walter.) — *Piqueria trinervia*. L. (Walter.) — *Pisum sativum*. L. (Kostelecky.) — *Plantago arenaria* W. K. (Semin. Brandeis. Opiz. Lissa. Nürnberg. Kostelecky.) — *Coronopus*. L. (Eisenstein.) — *lanceolata*. L. (Jesuitengarten. Mann) — *major uliginosa*. Schmidt. (Prag. Kostelecky.) — *maritima*. L. — (Gizfowic. Neumann.) — *maritima Wulfenii*. Sprengl. (Thüringen. Hornung.) — *media*. L. (Krumm. Bayer.) — *Pseudolusitanica*. R. et S. (Grabowsky.) — *altissima*. L. (Weihe.) — *Belardi*. Allion. (Kostelecky.) — *pumila*. L. (Kostelecky.) — *Platanus acerifolia*. L. (Günther.) — *Plectranthus fruticosus*. Heritier. (Speckmoser.) — *Plumbago zeylanica*. L. (Adamowsky.) — *Poa aegyptiaca*. W. (Weihe.) — *alpina*. L. (Reinegger. Grätz. Speckmoser.) — *alpina vivipara*. Host (Mariazell. Hölzel.) — *bulbosa vivipara*. Schrader. (Eöln. Schlmeyer. Prag. Moschner.) — *caesia*. Smith. (Uechtriz.) — *compressa*. L. (Prag. Opiz.) — *depauperata*. Kitaibel. (Prag. Kostelecky.) — *effusa*. Kit. (Weihe.) — *mexicana*. Lagasc. (Kostelecky.) — *pratensis angustifolia*. Gaud. vom Herrn



Sehlmeier ist *P. pratensis vulgaris*. R. et S. Mann. — procumbens. Smith. (Kosteletzky) — serotina. Ehrh. vom Herrn Kosteletzky ist *P. pratensis*. L. Mann. *P. trivialis*. L. Kosteletzky. — annua. L. (Prag. Eisenstein.) — aquatica. L. (Welschtrus. Chotek. Arumman. Bayer) — decumbens. Scop. (Schönwald. Petters.) — dura. Scopol. (Prag. Moschner.) — Eragrostis. L. (Prag. Opiz.) — fluitans. (Prag. Kosteletzky.) — nemoralis. L. (Prag. Kosteletzky.) — sudetica. Haenke. (Hofstein. Carl.) — trivialis. L. (Prag. Kosteletzky.) — sicula. L. (Kosteletzky.) — nervata. L. (Weihe.) — caroliniana. Sprengl. (Kosteletzky.) — *Podalyria* austratis. L. (Günther.) — *Pogonatum* urnigerum. (Reinerz. Uechtriz.) — aloides. (Böhmischaitcha. Opiz.) — nanum. (Prag. Kosteletzky.) — *Polemonium* mexicanum. Cervant. (Reichenbach.) — coeruleum. L. (Chotek.) — coeruleum fl. albo. (Mann. Masner.) — *Polygonum* arvense. L. (Brozan. Opiz.) — *Polygala* vulgaris floribus coeruleis. (Prag. Adamowsky.) — amara. L. (Baden. Salzburg. Hinterhuber.) — major. Jacq. (Leopoldsb. Jungbauer.) — chamaebuxus. Linn. (Karlsstein. Palliard.) — vulgaris. L. (Prag. Kosteletzky.) — *Polygonum* aviculare arvense. (Leipzig. Gerhard.) — Laxmanni. Lepech. (Günther.) — minus. Aiton. (Minden. Weihe. Dorn. Mörkenstein.) — alpinum. L. (Günther.) — aviculare L. (Arumman. Bayer.) — Bistorta. L. (Weisewiese. Eisenstein.) — Convolvulus. L. (Arumman. Bayer.) — Fagopyrum. L. (Chotek.) — Hydropiper. L. (Prag. Kosteletzky.) — incarnum. Schmidt. (Prag. Mann.) — Persicaria. L. (Prag. Kosteletzky.) — emarginatum. Roth. (Steudel.) — tataricum. L. (Hornung.) — orientale. L. (Chotek.) — amphibium. L. (Glaswettin. Eisenstein.) — divaricatum. L. (Hornung. Maly.) — *Polypodium* alpestre. Hoppe. (Schlesien. Grabowsky.) — calcareum. (St. Ivan. Mann.) — rigidum. Hoffm. (Untersberg. Hinterhuber.) — aureum. (Hinterhuber.) — vulgare. (Bischofberg. Opiz.) — Dryopteris. (St. Ivan. Opiz.) — Phegopteris. (Böhmischaitcha. Prochaska.) — *Polypogon* monspeliensis. Desf. (Kosteletzky.) — vaginatus. Willd. (Günther.) — fasciculatus. P. (Weihe.) — *Polytrichum* aloides. Hedw. (Regensburg Graferwald. Stockar.) — urnigerum. L. (Böln. Sehlmeier.) — aurantiacum. Hoppe. (Untersberg. Barten-

stein.) — juniperinum. (Karlst. Opiz.) — piliferum. (Böhmischb. Prochaska. Prag. Opiz.) — yuccaefolium. (Prag. Kosteletzky. Podoll Grub. Kr. Opiz.) — alpinum. (Heiligenblut. Bartenstein.) — *Polythrincium* Trifolii. Kunze. (Leipzig. Gerhard.) — *Populus* monilifera. Ait. (Günther.) — alba. L. (Maly.) — tremula. L. (Bischofberg. Opiz.) — graeca. Aiton. (Günther.) — dilatata. Aiton. (Adamowsky.) — *Porina* pertusa. (Jätschenberg. Benesch.) — *Portulaca* oleracea. L. (Prag. Kosteletzky.) — *Potamogeton* cornutum. Presl. (Bohdanec. Opiz.) — lucens. L. (Böheim. Mann. Stephansüberfuhr. Moschner.) — natans. L. (Böhmischb. Prochaska.) — praelongum. Wulfen. (Stechenflus zu Euerzdorf. Walter.) — *Potentilla* crassa. Tausch. (Profop. Mann.) — nemoralis. Nestler. (Lausitz. Burkhard. Hirschberg. Neumann.) — norvegica. L. (Hirschberg. Neumann. Bohdanec. Mann. Opiz.) — obscura. Willd. (Prag. Maly.) — recta. L. (Prag. Kosteletzky.) — rupestris. L. (Prag. Kosteletzky.) — subacaulis. L. (Podbaba. Opiz. Mainz. Ziz. Berlin. Schlechtendahl.) — thuringiaca. Bernh. (Braun.) — *Tormentilla*. Schrank. (Lausitz. Burkhard.) — alba. L. (Nemoschic. Opiz. Stern. Eisenstein.) — anserina. L. (Wettrus. Chotek.) — canescens. Besser. (Prag. Kosteletzky.) — clusiana. Jacq. (Grätz. Speckmoser.) — opaca. L. (Prag. Kosteletzky.) — reptans. L. (Prag. Kosteletzky.) — verna. L. (Prag. Tausch. Karlstein. Kosteletzky.) — fruticosa. L. (Wawak.) — fragariastrum. Ehrh. (Mennighüffen. Weihe. Kaiserslantern. Koch.) — pedata. Willd. (Günther.) — collina. Wiebel. (Grätz. Speckmoser. — Kosteletzky.) —

Die in diesen Verzeichnissen aufgeführten Pflanzen sind auch nach Verlauf einiger Zeit noch als vorräthig anzusehen, und sie können sowohl in einzelnen Exemplaren, als in beliebiger Mehrzahl ausgewählt werden. Ich bitte die hier nicht verzeichneten Arten bei Einsammlung zu beachten, um dieses Verzeichniß nach und nach der möglichsten Vollständigkeit zu nähern. Ich ersuche zugleich, mir die Berichtigung falsch bestimmter Pflanzen, auf abgesonderten Zetteln zukommen zu machen, um solche in den gegenwärtigen Verzeichnissen aufnehmen zu können. Prag, am 4. September 1825.

P. M. Opiz